

| Espèce | Tendances des effectifs | Effectifs | |
|------------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| | | 29/11/2023 | 15/11/2023 |
| Canard chipeau | ↑ | 237 | 147 |
| Canard colvert | ↑ | 758 | 551 |
| Canard pilet | ↑ | 995 | 103 |
| Canard siffleur | → | 3 | 6 |
| Canard souchet | ↑ | 678 | 395 |
| Cygne tuberculé | → | 3 | 4 |
| Fuligule milouin | ↓ | 62 | 181 |
| Fuligule morillon | → | 0 | 12 |
| Oie cendrée | ↑ | 65 | 4 |
| Oie rieuse | | | |
| Sarcelle d'hiver | ↑ | 2522 | 1101 |
| Sarcelle d'été | | | |
| Tadorne de belon | | | |
| Fuligule à tête noire | → | 2 ♀ | 2 ♀ |
| Fuligule milouinan | → | 2 ♂ + 2 ♀ | 2 ♀ |
| Fuligule nyroca | → | 0 | 1 |
| Harelde boréale | → | 1 | 1 |
| Nette rousse | → | 1 ♀ | 0 |
| Faisan de Colchide | ↓ | 2 | 22 |
| Foulque macroule | ↑ | 114 | 23 |
| Gallinule poule d'eau | → | 7 | 0 |

| | | | |
|------------------|---|----|----|
| Grand cormoran | ↑ | 95 | 16 |
| Grèbe huppé | → | 14 | 6 |
| Grèbe castagneux | | | |
| Grèbe à cou noir | → | 3 | 1 |
| Martin pêcheur | → | 1 | 6 |
| Râle d'eau | → | 8 | 11 |

| | | | |
|-------------------|---|-----|-----|
| Aigrette garzette | → | 45 | 46 |
| Bihoreau gris | | | |
| Butor étoilé | | | |
| Cigogne blanche | → | 4 | 3 |
| Crabier chevelu | | | |
| Flaman rose | → | 1 | 0 |
| Grande aigrette | → | 21 | 11 |
| Grue cendrée | ↑ | 342 | 16 |
| Héron cendré | → | 36 | 38 |
| Héron garde-bœuf | ↓ | 0 | 122 |
| Héron pourpré | → | 0 | 1 |
| Ibis falcinelle | | | |
| Spatule blanche | → | 11 | 0 |

| | | | |
|----------------------|---|----|---|
| Avocette élégante | | | |
| Barge à queue noire | | | |
| Barge rousse | | | |
| Bécasseau cocorli | | | |
| Bécasseau variable | ↑ | 19 | 0 |
| Bécassine des marais | ↑ | 14 | 0 |

| | | | |
|------------------------------|----------|----------|-----------|
| Chevalier aboyeur | → | 1 | 0 |
| Chevalier arlequin | → | 1 | 0 |
| Chevalier cul-blanc | | | |
| Chevalier gambette | | | |
| Chevalier guignette | | | |
| Chevalier sylvain | | | |
| Courlis cendré | | | |
| Combattant varié | | | |
| Phalarope à bec large | ↓ | 0 | 34 |
| Grand gravelot | | | |
| Petit gravelot | | | |
| Pluvier doré | | | |
| Vanneau huppé | ↑ | 442 | 28 |

| | | | |
|--------------------------|---|-----|---|
| Balbuzard pêcheur | ↓ | | 1 |
| Busard des roseaux | ↑ | 10 | 5 |
| Busard saint-martin | | | |
| Buse variable | | | |
| Epervier d'Europe | | | |
| Faucon crécerelle | ↑ | 1 | 0 |
| Faucon pèlerin | ↑ | 1 ♂ | 0 |
| Élanion blanc | → | 1 | 1 |
| Milan royal | | | |
| Pygargue à queue blanche | | | |

| | | | |
|--------------------|---|---|---|
| Goéland brun | | | |
| Goéland leucophée | → | 2 | 1 |
| Goéland marin | | | |
| Mouette pygmée | → | 0 | 2 |
| Mouette rieuse | → | 8 | 0 |
| Sterne sp. | → | 0 | 4 |
| Sterne pierregarin | → | 0 | 1 |

| Légende | |
|---------|--|
| | Espèce rarement observée sur la réserve |
| | Espèce observée pour la première fois sur la réserve naturelle |

Les comptages sont réalisés tous les 15 jours d'octobre à mars.
Les tendances des effectifs sont calculées entre les deux derniers comptages.